

INFECTIEPREVENTIE

Voorkom verspreiding van schurft

Symptomen:

- Jeuk (vooral 's nachts)
- Rode streepjes met daaromheen bultjes



Schurftmijt
(veroorzaker van schurft)

Waar?

Polsen, tussen de vingers, oksels, kruis, billen, zijkant buik, voeten.



Behandeling

Smeer het lichaam in met crème voorgeschreven door de arts.


Welke beschermende kleding:




Isolatiejas met lange mouw



Nitril handschoenen



Matras 3 dagen luchten bij kamertemperatuur en grondig stofzuigen.



Hoe wordt het overgebracht?

Door 15 min. huid op huid contact met iemand die schurft heeft. Dit kan door:



Wassen van een cliënt



Kleding dragen van iemand met schurft



Na seksueel contact



In hetzelfde bed liggen

60°



Alle kleding en textiel dat 3 dagen voor of tijdens de behandeling direct op de huid is gedragen, wassen op 60°C.

Bij textiel dat niet gewassen mag worden of niet bij 60°C:

3 dagen in een afgesloten zak bewaren. Daarna wassen op de toegestane temperatuur, vervolgens direct in de droogtrommel of strijken.



Advies nodig bij het werken volgens de WIP richtlijnen?
0485 58 11 29 | instellingen@abena.nl
www.abena.nl/infectiepreventie



INFECTIEPREVENTIE

Voorkom verspreiding van schurft

Gebruik de juiste producten

Classic Nitril
poedervrij

290417 - XS

290418 - S

290419 - M

290420 - L

290421 - XL



Classic Nitril poedervrij
met lang manchet

290466 - XS

290467 - S

290468 - M

290469 - L

290470 - XL



Isolatiejas met
lange mouw

240190 - L

240191 - XL



Ademhalingbeschermingsmasker
Type eendenbek, groen

740242



Meer weten over schurft en andere infectieziekten?
Kijk op www.abena.nl/infectieziekten

Advies nodig bij het werken volgens
de WIP richtlijnen?
0485 58 11 29 | instellingen@abena.nl
www.abena.nl/infectiepreventie

